

# PLAGAS IMPORTANTES

## Umbral Económico y Algunas Recomendaciones Para su Control



Desde 1954

### GUSANO COGOLLERO:

Cuando se encuentre un 20% de presencia o daño aplicar: **Clorpirifos etil 480 0.5 ó 0.75 Lt/Ha**, **Cipermetrina 0.25 Lt/Ha**, **Lambda cyalotrina 0.2-0.3 Lt/Ha**, **Palgus 75 ml** o **Denim 100 ml/Ha**.



Larva



Huevecillos, se les encuentra en el envés de las hojas



Adulto

### ELOTERO en MAIZ:

Cuando se encuentre 20% de huevecillos en los pelos del jilote en esta plaga se recomienda la liberación de *Trichogramma*.



Larva



Avispa de *Trichogramma* parasitando a un Huevecillo de Elotero



Adulto

### MOSCA MIDGE en SORGO:

Muestrear en la mañana al inicio de la floración y revisar 10 panojas en 10 sitios. Aplicar un insecticida cuando se encuentre una mosca por panoja (**Clorpirifos etil 480 1 Lt/Ha**, **Diazinon 2 Lts/ Ha**, **Lanate 90 250 Gr/ Ha**, **Decis Forte 40 ml / Ha**, **Lambda cyalotrina 0.2-0.3 Lt/ Ha**).



### CHINCHE CAFE / Chinchas en SORGO:

Revisar en llenado de grano en 10 panojas en 10 puntos de muestreo y cuando se encuentre 2 chinchas (inmaduras o adultas) por panoja aplicar cualquiera de los siguientes insecticidas: **Lorsban 0.75 Lt/Ha**, **Thiodan 1 Lt/Ha**, **Dimetoato 1 Lt/ Ha** o **Malathion 1000 E 0.5 Lt/ Ha**.



El color rojo indica que son organofosforados y no se debe aplicar en 3 o en 4 semanas, antes o después de la aplicación del herbicida Peak.

Fuente: M.C. VICTOR MAYA HDZ.  
Entomólogo del INIFAP