


**¡ALTO!**  
**LEA EL PANFLETO ANTES DE USAR EL  
 PRODUCTO Y CONSULTE AL PROFESIONAL  
 EN CIENCIAS AGRÍCOLAS**



# Clorprid 20 SL

**INSECTICIDA - CLORONICOTINILO  
 IMIDACLOPRID**



**DAÑINO**

**ANTÍDOTO: NO TIENE  
 DENSIDAD: 1.104 g/ml a 20° C**

**ESTE PRODUCTO PUEDE SER MORTAL SI SE INGIERE Y/O  
 SE INHALA, PUEDE CAUSAR DAÑOS A LOS OJOS Y A LA  
 PIEL POR EXPOSICIÓN.**

**NO ALMACENAR EN CASAS DE HABITACIÓN.  
 MANTÉNGASE ALEJADO DE LOS NIÑOS, PERSONAS  
 MENTALMENTE INCAPACES, ANIMALES DOMÉSTICOS,  
 ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS.**



#### **USO AGRONÓMICO**

**MODO DE ACCIÓN:** Es un insecticida sistémico y vi- dual, con actividad por contacto e ingestión el cual es ab- sorbido por vía foliar y radicular. Activa y luego bloquea los impulsos nerviosos en los receptores aoetilcolínicos. lo que produce la muerte de los insectos. Muestra activi- dad antialimentaria lo que evita la transmisión de virus y controla el daño producido.

**EQUIPO DE APLICACIÓN:** Se recomienda su aplicación al follaje usando equipos terrestres (manual, de tracción animal o mecánica) o equipo aéreo. El equipo a usar debe estar bien calibrado y sin derrames. Utilice boqui- llas de cono hueco. Después de ser usado, el equipo debe ser lavado cuidadosamente con agua y jabón.



**FORMA DE PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:** Llene el tanque de aplicación hasta la mitad de su volumen con agua, agregue la dosis recomendada del producto y agi- te; termine de llenar con agua limpia el tanque del equipo de aplicación y mantenga la agitación incluso durante la aplicación. El equipo de aplicación y los utensilios usa- dos en la mezcla del producto deben ser lavados después de cada jornada de trabajo, por lo menos tres veces. Mantenga en agitación constante la mezcla dentro del tanque. Preparé únicamente la solución que pueda ser aplicada durante el mismo día.



**RECOMENDACIONES DE USO:  
 ENFERMADES QUE CONTROLA:**

NOMBRE COMUN	NOMBRE CIENTIFICO
Afido negro de las legumbres	Aphis craccivora
Afido verde de los cítricos	Aphis spiraecola
Mosca blanca	Bemisia tabaci
Afido ceroso del repollo	Brevicoryne brassicae
Chinche verde pequeña	Empoasca fabae
Afido verde	Myzus persicae
Minador de la hoja de cítricos	Phyllocnistis citrella
Tripido de la berenjena	Thrips palmi
Minador de las hojas	Liriomyza spp
Saltoncillo verde	Nephotettix bipunctatus
Mosca blanca de invernadero	Trialeurodes vaporariorum
Afido de la papa	Macrosiphum euphorbiae
Mosca blanca lanuda	Aleurothrixus floccosus

#### **CULTIVOS**

NOMBRE COMUN	NOMBRE CIENTIFICO
Apio	Apium gravaolens
Cítricos	Crtrus spp
Sandía	Citrullus fanatus
Pepino	Cucumis sativos
Melón	Cucumis melo
Lechuga	Lactuca sativa
Ají	Capsicum annum
Papa	Solanum tuberosum
Tabaco	Nicotiana tabacum
Habichuela	Phaseolus vulgaris
Tomate	Lycopersicon sculentum
Repollo	Brassica oleracea var capitata

**DOSIS RECOMENDADA:** Utilice de 500 a 600 Mililitros del producto formulado por hectárea.

**INTERVALO DE APLICACIÓN:** Podrá realizarse subsiguientes aplicaciones cuando monitoreos realizados in- diquen que la presencia de las plagas ha alcanzado, de nuevo; el umbral económico.

**INTERVALO ENTRE LA ÚLTIMA APLICACIÓN Y LA COSE-  
 CHA:** En apio, sandía, pepino, melón, lechuga, ají, habi- chuela y tomate, 3 días; en cítricos y papa, 30 días; en tabaco, 15 día y en repollo, 28 días.

**INTERVALO DE REINGRESO AL ÁREA TRATADA:** Espere

**COMPATIBILIDAD:** Este producto es compatible con la mayoría de los agroquímicos comunes en el mercado, excepto los de reacción alcalina.

**FITOTOXICIDAD:** No es un producto fitotóxico si se sigue las recomendaciones dadas en el panfleto.

## PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

**ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:** No transporte ni almacene conjuntamente con alimentos de consumo humano, animal, fertilizantes ni semillas. Almacéñese y transpórtese en su envase original, en lugar seco y ventilado y lejos del alcance de los niños o personas mentalmente incapaces. Maneje el producto cuidadosamente para evitar derrames. Si el derrame ocurre, cúbralo con aserrín o tierra y entiérrelo en lugares alejados de fuentes de agua y casas de habitación.

**NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACIÓN. MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**



**NO COMER, BEBER O FUMAR DURANTE EL MANEJO Y APLICACIÓN DE ESTE PRODUCTO. BÁÑESE DESPUÉS DE TRABAJAR Y PÓNGASE ROPA LIMPIA.**



### SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN:

Decaimiento general, escalofríos, disnea y temblores.

### PRIMEROS AUXILIOS:

**POR INGESTIÓN:** Dé a beber al intoxicado tres cucharadas de carbón activado en medio vaso de agua. Si no tiene carbón activado, déle a beber clara de huevo con un poco de agua (8 para adultos, 4 para niños). Busque ayuda médica.

**POR CONTACTO CON LA PIEL:** Quítese inmediatamente las ropas contaminadas y lávese con abundante agua y jabón la parte afectada. Obtenga atención médica.

**POR INHALACIÓN:** Traslade al paciente a un lugar no contaminado y manténgalo en reposo. Busque ayuda médica.

**POR CONTACTO CON LOS OJOS:** Lávese éstos por espacio de 15 minutos con abundante agua limpia. Obtenga atención médica.

**NUNCA DÉ A BEBER, NI INDUZCA AL VÓMITO A PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA.**

### ANTÍDOTO Y TRATAMIENTO MÉDICO:

No tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático y de sostén.

### CENTROS NACIONALES DE INTOXICACIÓN:

#### Hospital Dr. Luis E. Aybar. (Morgan)

C/Federico Velásquez No. 1  
Teléfono: 684-3478/3672  
Santo Domingo, D.N.

#### Hospital Dr. Feo. Moscoso Fuelle

Av. Nicolás de Ovando No. 225  
Teléfono: 681-2913/6922 Santo Domingo, D.N.

## MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:



### TÓXICO PARA PECES

**NO CONTAMINE RÍOS, LAGOS, ESTANQUES O FUENTES CON AGUA SUBTERRANEAS CON ESTE PRODUCTO O CON ENVASES O EMPAQUES VACÍOS**



### TÓXICO PARA ABEJAS

**MANEJO DE ENVASE; EMPAQUES; DESECHOS Y REMANENTES:** Los envases vacíos deben pasar por el proceso de limpieza de "triple lavado" y luego deben destruirse y enterrarse a una profundidad no menor de 40 cm, lejos de fuentes de agua y casas de habitación. Si existen desechos o remanentes del producto no deben ser vaciados en fuentes de agua, éstos deben ser eliminados en lugares lejanos a ellas y de preferencia dentro de agujeros especiales fuera de las plantaciones tratadas.

**EL USO DE ENVASES O EMPAQUES EN FORMA DIFERENTE PARA LO QUE FUERON DISEÑADOS, PONE EN PELIGRO LA SALUD HUMANA Y EL AMBIENTE.**

**AVISO DE GARANTÍA:** El fabricante únicamente garantiza la composición química y la calidad de este producto, siempre y cuando el mismo se encuentre en su envase original, bien cerrado y con el sello de garantía inalterado. El consumidor acepta y usa este producto sujeto a estas condiciones.

### FABRICANTE Y FORMULADO POR: PORPORAS

S.A.  
C/ Informática, 5  
43330 RIUDOMS, Tarragona • España

### IMPORTADO Y REGISTRADO POR:

AGROPECUARIA LA CUMBRE, S.A.  
Calle 27 de febrero N°37  
SAN JOSÉ DE OCOA - República Dominicana

PAÍS	N° de Registro	Fecha de Registro
RER DOM.	3.305	10/08/2009