# Control de cañita en
# Sorgo - Soya - Maíz - Okra

Predio infestado con cañita

## TRAMIENTO A LA SEMILA:

Tratando la semilla de sorgo con CONCEPT III, y a la siembra, sobre el "tapo" húmedo, aplicar el herbicida Metolaclor + 1Kg/ha de Atrazina Calibre 90. A la emergencia se eliminaran las malezas que no están tratadas con el CONCEPT, incluyéndolas plántulas que provengan de semilla de Zacate Johnson y de cañita. Se requiere de muy buena humedad en el suelo para que el herbicida controle a las malezas. Si la humedad no es buena, el control será deficiente.

Aplicación manual

## CONTROL QUÍMICO MANUAL:

Se usa una mezcla de Glyfosato (20% de producto comercial) + un 80% de agua. Se pega una esponja en un guante de hule, se impregna la esponja con el herbicida, y la cañita, polocote, zacate Johnson y otras malezas se morirán en un promedio de 7 días, al tocar sólo la parte superior de las malezas con la esponja, al espigamiento o en floración, antes de que formen semilla.

Procedimiento para preparar la mezcla de Glyfosato más agua

Efecto después de 10 días

Hacer la aplicación en sorgos espigados, para que la cañita este bien definida y no haya dudas. Aplicar manualmente a las plantas de cañita que sobre salgan del sorgo, en el último tercio, cerca a la hoja bandera, en plantas que esten en bota, por espigar o espigando, pero antes de que formen el grano y evitar su reproducción".



Con y Sin Control

Buen Control

## CONTROL MANUAL:

Usando un machete o cortando sólo las espigas de la cañita previo a que formen semilla o antes de que estas se caigan al suelo por acción del aire, una vez cortadas las espigas deben ser depositadas en un costal para sacarlas fuera del terreno.

Todo lo que se pueda hacer por reducir la cantidad de semillas de la Cañita en sus terrenos será muy importante. Semillas que pueden prevalecer por más de 10 años sin germinar.

De haber alguna duda en el uso de estas prácticas sencilla, puede llamar al PIFSV.

**NOTA: La rotación de cultivos es una buena práctica para el control de malezas difíciles.**

Eliminar sólo las espigas para reducir la semilla en el predio.

***Si se usa una dosis más alta del Glyfosato, con sólo una cantidad mínima pueden dañar al cultivo de interés.***

***"Al Servicio de los Agricultores"***

PATRONATO PARA LA INVESTIGACIÓN, FOMENTO Y SANIDAD VEGETAL

PIFSV

***Desde 1954***

**Dirección: Av. Canadá y Ontario Col. San José H. Matamoros, Tamaulipas.**
**Tel: (868) 813-1560, 816-6186 pifsvmat@prodigy.net.mx, www.pifsv.org.mx**