


**¡ALTO!**  
**LEA EL PANFLETO ANTES DE USAR EL  
 PRODUCTO Y CONSULTE AL PROFESIONAL  
 EN CIENCIAS AGRÍCOLAS**



# Ziper 10 WP

**INSECTICIDA, ACARICIDA • CARBOXAMIDA  
 HEXITIAZOX**



**DAÑINO**

**ANTÍDOTO: NO TIENE**

**ESTE PRODUCTO PUEDE SER MORTAL SI SE INGIERE Y/O SE INHALA, PUEDE CAUSAR DAÑOS A LOS OJOS Y A LA PIEL POR EXPOSICIÓN.**

**NO ALMACENAR EN CASAS DE HABITACIÓN. MANTÉNGASE ALEJADO DE LOS NIÑOS, PERSONAS MENTALMENTE INCAPACES, ANIMALES DOMÉSTICOS, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS.**



## USO AGRONÓMICO

**MODO DE ACCIÓN:** Insecticida - Acaricida, no sistémico con actividad por ingestión y contacto, de prolongado efecto residual, que actúa sobre huevos, larvas y ninfas de numerosas especies de ácaros. No controla individuos adultos pero resulta efectivo sobre las puestas de huevos de hembras tratadas. Su actividad puede durar hasta dos meses. Este acaricida Inhibe la síntesis de la quitina en todos los estados del ciclo biológico de los ácaros sensibles

**EQUIPO DE APLICACIÓN:** Aplique con cualquier equipo de aspersión: bomba de mochila manual, de motor, equipo acoplado al tractor o con avión. Antes de aplicar verifique el estado de su equipo y calibre adecuadamente. Utilice boquillas de cono hueco procurando mojar el follaje. Recuerde lavar el equipo de aplicación antes y después de cada aplicación. Use equipo de protección personal.



**FORMA DE PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:** Llene el tanque de aplicación hasta la mitad de su volumen con agua, agregue la dosis recomendada del producto y agite; termine de llenar con agua limpia el tanque del equipo de aplicación y mantenga la agitación incluso durante la aplicación. Use equipo de protección personal.



## RECOMENDACIONES DE USO

### ENFERMEDADES QUE CONTROLA

NOMBRE COMUN	NOMBRE CIENTIFICO
Acaro plano	Brevipalpus phoenicis
Barrenador	Elasmopalpus lignosellus
Gusano bellotero	Heliothis zea
Falso medidor	Trichoplusia ni
Arañita roja del naranjo	Panonychus citri
Minador de la hoja de los cítricos	Phyllocnistis citrella
Acaro tostador	Phyllocoptruta oleivora
Acaro del brote	Phytonemus pallidus
Gusano cogollero	Spodoptera frugiperda
Acaro rojo	Tetranychus spp

### CULTIVOS

NOMBRE COMUN	NOMBRE CIENTIFICO
Arroz	Oryza sativa
Cítricos	Citrus spp.
Fresas	Fragaria vesca
Maíz	Zea mays
Melón	Cucumis melo
Sandía	Citrullus lanatus
Pepino	Cucumis sativus
Tomate	Lycopersicon esculentum

**DOSIS RECOMENDADA:** Usar de 60 -100 gramos / hectárea.

**INTERVALO DE APLICACIÓN:** Aplicar cuando exista la presencia de larvas, huevos y ninfas de insectos, repetir tantas veces sea necesario.

**INTERVALO ENTRE LA ÚLTIMA APLICACIÓN Y LA COSECHA:** En Arroz, cítricos y maíz: 14 días, en el resto de los cultivos 7 días.

**INTERVALO DE REINGRESO AL ÁREA TRATADA:** Esperar que el rocío de la aplicación haya secado, como mínimo 12 horas.

**COMPATIBILIDAD:** Es aconsejable su mezcla con acaricidas de contacto activos frente a adultos. Compatible con otros fitofarmacos, inclusive con los alcalinos, pero no se debe mezclar con piretroides sintéticos ni con diazinon o metidation.

**FITOTOXICIDAD:** No es fitotóxico usándolo a la dosis y forma de uso recomendado.

### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

**ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:** Almacénesse y transpórtese el producto en lugares frescos, secos y aireados, lejos de alimentos, forrajes y medicamentos. Manténgalo en su envase original, bien cerrado y etiquetado.

No transporte ni almacene este producto junto con alimentos, forrajes, medicamentos, ropa y utensilios de uso doméstico. No

mantenga este producto en contacto con otros agroquímicos, fertilizantes ni semillas. Almacénelo bajo llave en un lugar fresco.

**NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACIÓN. MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**



**NO COMER, BEBER O FUMAR DURANTE EL MANEJO Y APLICACIÓN DE ESTE PRODUCTO. BÁÑESE DESPUÉS DE TRABAJAR Y PÓNGASE ROPA LIMPIA.**



**UTILICE EL SIGUIENTE EQUIPO DE PROTECCIÓN AL MANIPULAR EL PRODUCTO. DURANTE LA PREPARACIÓN DE LA MEZCLA. CARGA Y APLICACIÓN: GUANTES Y BOTAS DE HULE, MASCARILLA, SOMBRERO, OVEROL, PROTECTOR DE OJOS, PANTALÓN Y CAMISA MANGA LARGA Y DELANTAL DE MATERIAL IMPERMEABLE**



#### **SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN:**

Puede causar irritación de los ojos, reacciones alérgicas como estornudos, obstrucción nasal, secreción nasal, dificultad respiratoria, dolor de cabeza, temblores, ataxia, náuseas, vómitos, debilidad de los miembros convulsiones.

#### **PRIMEROS AUXILIOS:**

**POR INGESTIÓN:** Dé a beber al intoxicado tres cucharadas de carbón activado en medio vaso de agua. Si no tiene carbón activado, déle a beber clara de huevo con un poco de agua (8 para adultos, 4 para niños). Busque ayuda médica.

**POR CONTACTO CON LA PIEL:** Quítese inmediatamente las ropas contaminadas y lávese con abundante agua y jabón la parte afectada. Obtenga atención médica.

**POR INHALACIÓN:** Traslade al paciente a un lugar no contaminado y manténgalo en reposo. Busque ayuda médica.

**POR CONTACTO CON LOS OJOS:** Lávese éstos por espacio de 15 minutos con abundante agua limpia. Obtenga atención médica.

**NUNCA DÉ A BEBER, NI INDUZCA AL VÓMITO A PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA.**

#### **ANTÍDOTO Y TRATAMIENTO MÉDICO:**

No tiene antídoto. El tratamiento es sintomático y de sostén.

#### **CENTROS NACIONALES DE INTOXICACIÓN:**

##### **Hospital Dr. Luis E. Aybar. (Morgan)**

C/Federico Velésquez No. 1  
Teléfono: 684-3478/3672  
Santo Domingo, D.N.

##### **Hospital Dr. Feo. Moscoso Fuelle**

Av. Nicolás de Ovendo No. 225  
Teléfono: 681-2913/6922  
Santo Domingo, D.N.

#### **MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:**



**TÓXICO PARA PECES**



**TÓXICO PARA ABEJAS**

**NO CONTAMINE RÍOS, LAGOS, ESTANQUES O FUENTES CON AGUA SUBTERRANEAS CON ESTE PRODUCTO O CON ENVASES O EMPAQUES VACÍOS**

**RESPETE LAS ÁREAS DE PROTECCION DE RIOS, QUEBRADAS Y OTRAS AREAS FRAGILES.**

**NO APLIQUE EL PRODUCTO EN CONDICIONES CLIMÁTICAS QUE FAVORECEN LA ESCORRENTÍA O DERIVA DEL PRODUCTO.**

**ASEGURESE QUE LAS ÁREAS DE PROTECCION DE LOS CAUCES DE AGUA ALEDAÑOS AL CULTIVO CUENTEN CON BARRERAS DE PROTECCION (TALES COMO VEGETACION) QUE MINIMICE LA DERIVA DEL PRODUCTO.**

#### **MANEJO DE ENVASES, EMPAQUES, DESECHOS Y REMANENTES:**

Los envases vacíos deben pasar por el proceso de limpieza de "triple lavado" y luego deben destruirse y enterrarse a una profundidad no menor de 40 cm, lejos de fuentes de agua y casas de habitación. Si existen desechos o remanentes del producto no deben ser vaciados en fuentes de agua, éstos deben ser eliminados en lugares lejanos a ellas y de preferencia dentro de agujeros especiales fuera de las plantaciones tratadas.

#### **EL USO DE ENVASES O EMPAQUES EN FORMA DIFERENTE PARA LO QUE FUERON DISEÑADOS, PONE EN PELIGRO LA SALUD HUMANA Y EL AMBIENTE.**

**AVISO DE GARANTÍA:** El fabricante, así como el distribuidor, garantizan las características físico-químicas de este producto. Con las instrucciones y recomendaciones técnicas tratamos de informar y asesorar no estando en condiciones de aceptar responsabilidad alguna en caso de que no surtiere efecto, ni por los daños que puedan producirse por el mal uso de este producto. El consumidor acepta este producto sujeto a estas condiciones.

#### **FABRICANTE Y EXPORTADO POR:**

**PORPORAS S.A.**

C/ Informática, 5

43330 RIUDOMS, Tarragona • España

#### **REGISTRADO Y DISTRIBUIDO POR:**

**AGROPECUARIA LA CUMBRE, S.A.**

Calle 27 de febrero N°37

SAN JOSÉ DE OCOA - República Dominicana

**PAÍS N° de Registro Fecha de Registro**