



Calmoseptine® Ointment

ยาใช้ผิวง่าย ใช้ภายนอกเพื่อป้องกันภาวะคายเคืองผิวหนัง



ข้อมูลผลิตภัณฑ์		
	ขนาดบรรจุ	จำนวนต่อกล่อง
Reg. No. 2C 15018/64	ซอง 3.5 กรัม	20 ซอง

Drug Facts	Drug Facts (continued)
Active ingredients Menthol 0.44%.....Anorectal Analgesic Zinc Oxide 20.6%...Anorectal Protectant, Astringent	Purpose • Do not put this product into the rectum by using fingers or any mechanical device or applicator. • Do not exceed the recommended daily dosage unless directed by a doctor.
Uses • Temporarily protects irritated areas. • For the temporary relief of: • local itching and discomfort in the perianal area • pain or burning • skin irritations	Stop use and ask a doctor if • condition worsens or does not improve within 7 days • bleeding occurs • symptom being treated does not subside or if redness, irritation, swelling, pain or other symptoms develop or increase. Keep out of reach of children. In case of accidental ingestion contact a Poison Control Center immediately.
Warnings: For external use only	Directions Adults: When practical, cleanse the affected area with mild soap and warm water and rinse thoroughly. Gently dry by patting or blotting with toilet tissue or a soft cloth or air dry before application of this product. • Apply externally to the affected area up to 6 times daily or after each bowel movement. • Children under 12 years of age: consult a doctor.
When using this product • Certain persons can develop allergic reactions to ingredients in this product. • Avoid contact with eyes.	Inactive ingredients chlorothymol, glycerin, lanolin, petrolatum, phenol, sodium bicarbonate, and thymol in a suitable ointment base

Manufactured by: Calmo Manufacturing, Inc.
16601 Burke Lane · Huntington Beach, California 92647 · U.S.A.

Imported by: Zuellig Pharma, Ltd.

8th - 9th Floor, Ploenchit Center, 2 Sukhumvit Road, Klongtoey, Klongtoey, Bangkok, 10110
Tel: 66 2656 9800 · Fax: 66 2656 9801 · www.zuelligpharma.com

ความถูกต้องของโฆษณานี้เป็นความรับผิดชอบของผู้โฆษณา มิได้ดำเนินการโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

โปรดอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารกำกับยา



Calmoseptine® Ointment

ยาขี้ผึ้ง ใช้ภายนอกเพื่อป้องกันการระคายเคืองผิวหนัง

ใช้เพื่อป้องกันการระคายเคืองผิวหนังและลดภาวะต่อไปนี้

อาการคันและไม่สบายตัวบริเวณรอบทวารหนัก • อาการปวดหรือแสบร้อนผิวหนัง • อาการระคายเคืองผิวหนัง



วิธีใช้

- ก่อนทายา ให้ทำความสะอาดผิวหนังบริเวณที่มีอาการด้วยสบู่อ่อนๆ แล้วล้างออก ซับหรือปล่อยให้แห้ง
- ทายาบางๆ บริเวณผิวหนังที่แดงหรือระคายเคือง วันละ 2-3 ครั้ง หากได้สูงสุดวันละ 6 ครั้งหรือหลังขับถ่ายหรือเปลี่ยนผ้าอ้อม

คำเตือน: สำหรับใช้ทาภายนอกเท่านั้น ห้ามใช้กับแผลลึกหรือแผลถูกแทง หลีกเลี่ยงไม่ให้สัมผัสถูกตา เก็บไว้ให้พ้นมือเด็ก กรณีที่มีการกลืนหรือกินยาโดยบังเอิญ ให้รีบนำส่งโรงพยาบาลทันที ไปพบแพทย์หากอาการแย่ลงหรืออาการไม่ดีขึ้นภายใน 7 วัน

ข้อมูลผลิตภัณฑ์		
	ขนาดบรรจุ	จำนวนต่อกล่อง
Reg. No. 2C 15018/64	ซอง 3.5 กรัม	20 ซอง

ตัวยาสำคัญ: เมนทอล, ซิงค์ออกไซด์
ส่วนประกอบอื่นๆ: ลานอลิน, ไวท์ปิโตรเลียม, โซเดียมบอเรต, คลอโรไทมอล, กลีเซอริน, ฟีนอล, ไทมอล, โซเดียมคาร์บอเนต, ไอร์ออนออกไซด์สีแดง

Manufactured by: Calmo Manufacturing, Inc.
16601 Burke Lane · Huntington Beach, California 92647 · U.S.A.

Imported by: Zuellig Pharma, Ltd.
8th - 9th Floor, Ploenchit Center, 2 Sukhumvit Road, Klongtoey, Klongtoey, Bangkok, 10110
Tel: 66 2656 9800 · Fax: 66 2656 9801 · www.zuelligpharma.com

การโฆษณาตามใบอนุญัตินี้ต้องกระทำโดยตรงต่อผู้ประกอบการโรคติดต่อ ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม หรือผู้ประกอบการบำบัดโรคผิวหนัง ผู้ใดนำโฆษณาไปเผยแพร่ต่อบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ประกอบการโรคติดต่อ ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม หรือผู้ประกอบการบำบัดโรคผิวหนัง ถือเป็นการฝ่าฝืน มาตรา 88 และมาตรา 88 ทวิ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท ตามตรา 124 แห่งพระราชบัญญัติยาพ.ศ. 2510 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม